

## Voorbeelden voor discussie EMV,PIM&PRISM

1. 8 jarige post-OK patiënt nabeademd na grote electieve ingreep onder midazolam en morfine.  
Wat scoort u voor de GCS (EMV)?

2. Bij uitzuigen van een 12 maanden oude zuigeling die wordt beademd wegens kinkhoest ontstaat een bradycardie (tot 60/min) die na onderbreken van uitzuigen spontaan herstelt.

Wat scoort u?

- a. Als deze op de controlelijst staat?
- b. Als deze niet op de controlelijst staat?

3. Een 3 jaar oude peuter met een meningococcensepsis krijgt tijdens beademing en hoge doses catecholaminen 14 u na opname op de PICU een bradycardie en hypotensie. CPR faalt en de patiënt overlijdt aansluitend.

Welke waarden van welk tijdsinterval gebruikt u voor de PRISM score?

4. Bij een patiënt met DIC is de aPTT 62 sec en de PTT normaal.  
Wat scoort u voor de stolling in de PRISM score?

5. Een patiënt ontwikkelt in een algemeen ziekenhuis een respiratoire insufficiëntie met een resp acidose (pH 7,13, pCO<sub>2</sub> 94, paO<sub>2</sub> 76 bij 3 l zuurstof 100% via neusslang).

Hoe scoort u voor de PRISM en PIM als:

- a. patiënt voor overplaatsing in het algemeen ziekenhuis wordt geïntubeerd en normocapnisch is bij aankomst op de PICU na transport door de verwijzer
- b. patiënt voor overplaatsing in het algemeen ziekenhuis wordt geïntubeerd en normocapnisch bij aankomst van uw transportteam in het verwijzend ziekenhuis
- c. patiënt voor overplaatsing door uw transportteam in het verwijzend ziekenhuis wordt geïntubeerd

6. Een traumapatiënt met aangezichtletsel en –oedeem en een brilhematoom.

Hoe scoort u:

- a. GCS (EMV)
- b. pupilreacties